

Harmonogram podawania leku CitraFleet® oraz niegazowanych płynów uzupełniających [szczególnie zalecane są wywary mięsne i warzywne (przecezione) oraz napoje izotoniczne bez barwnika, a ponadto jasne soki owocowe, klarowne, np. jabłkowy, winogronowy, słaba herbata i wody smakowe], **2 litry po każdej saszetce (razem 4 litry)**. Nie należy pić wyłącznie czystej wody.

W czasie przygotowania do badania można spożywać tylko płyny wymienione powyżej!

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA (ZE ZNIECZULENIEM OGÓLNYM):

Godzina wypicia pierwszej dawki leku rozpuszczonej w 150 ml wody	Godzina rozpoczęcia picia 2 litrów płynów (należy je wypić w ciągu 5 godzin)	Godzina zakończenia picia płynów
18:00	18:30	23:30



Po każdej saszetce wypić 2 litry płynów.

Godzina kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym	Godzina wypicia drugiej dawki leku rozpuszczonej w 150 ml wody	Godzina rozpoczęcia picia 2 litrów płynów (należy je wypić w ciągu 2 godzin)	Godzina zakończenia picia płynów
8:00	1:30	2:00	4:00
9:00	2:30	3:00	5:00
10:00	3:30	4:00	6:00
11:00	4:30	5:00	7:00
12:00	5:30	6:00	8:00
13:00	6:30	7:00	9:00
14:00	7:30	8:00	10:00
15:00	8:30	9:00	11:00
16:00	9:30	10:00	12:00
17:00	10:30	11:00	13:00
18:00	11:30	12:00	14:00
19:00	12:30	13:00	15:00

PROCEDURA PRZYGOTOWANIA (BEZ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO):

Godzina wypicia pierwszej dawki leku rozpuszczonej w 150 ml wody	Godzina rozpoczęcia picia 2 litrów płynów (należy je wypić w ciągu 5 godzin)	Godzina zakończenia picia płynów
18:00	18:30	23:30



Godzina kolonoskopii bez znieczulenia	Godzina wypicia drugiej dawki leku rozpuszczonej w 150 ml wody	Godzina rozpoczęcia picia 2 litrów płynów (należy je wypić w ciągu 3 godzin)	Godzina zakończenia picia płynów
8:00	2:30	3:00	6:00
9:00	3:30	4:00	7:00
10:00	4:30	5:00	8:00
11:00	5:30	6:00	9:00
12:00	6:30	7:00	10:00
13:00	7:30	8:00	11:00
14:00	8:30	9:00	12:00
15:00	9:30	10:00	13:00
16:00	10:30	11:00	14:00
17:00	11:30	12:00	15:00
18:00	12:30	13:00	16:00
19:00	13:30	14:00	17:00

Uwaga: niestosowanie się do zaleceń dotyczących diety oraz picia płynów może skutkować nieodpowiednim oczyszczeniem jelita i koniecznością powtórzenia badania