

PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII

- 1. Na trzy dni przed kolonoskopią należy spożywać zupy w formie zmiksowanej (zupy krem), budynie, jogurty, kisiele. Nie należy spożywać sałatek jarzynowych, owoców pestkowych, pestek, siemienia lnianego, ziarnistego (ciemnego) pieczywa i maku.**
- 2. W dniu poprzedzającym badanie jemy płynne śniadanie bez mleka, surowych owoców i warzyw oraz napojów gazowanych. Można spożyć zupę w formie zmiksowanej (zupa krem), kisiel, budyń, serek homogenizowany bez dodatków, jogurt naturalny. Inne napoje, zwłaszcza wodę niegazowaną można pić w dowolnej ilości. Dodatkowo rozpoczynamy przyjmowanie preparatu oczyszczającego jelito, zleconego przez lekarza (FORTRANS, CITRAFLEET, MOVIPREP, FLEET PHOSPHO-SODA, CLENSIA) – przygotowanie i przyjmowanie preparatu wg zaleceń producenta. Od chwili wypicia preparatu przeczyszczającego nie należy nic jeść. Można pić dowolną ilość wody niegazowanej – w dniu poprzedzającym badanie. Normalną reakcją na lek powinny być wypróżnienia, pod koniec treścią płynną. Wypróżnienia czystą wodą oznaczają dobre przygotowanie jelita do badania.**
- 3. W dniu badania – należy pozostać na czczo. Nie powinno się już pić roztworu przeczyszczającego. Nie powinno się przyjmować posiłków i napojów – wyjątkiem jest badanie w godzinach popołudniowych – wtedy rano można jeszcze pić wodę niegazowaną w niewielkiej ilości . W przypadku konieczności przyjęcia porannej dawki leków prosimy o ich popicie niewielką ilością wody niegazowanej.**

Badania będą potwierdzane telefonicznie 2-3 dni przed badaniem przez rejestrację Centrum Medycznego Promyk. W przypadku pytań, problemów z przygotowaniem bądź rezygnacji z badania prosimy o informację telefoniczną :

34/372 39 39, 604 24 51 24

LEKI PRZED KOLONOSKOPIĄ

1. Osoby z chorobami wymagającymi stałego, regularnego przyjmowania leków z powodu chorób przewlekłych - w dniu badania powinny zażyć poranną dawkę leków popijając niewielką ilością wody niegazowanej.
2. Osoby chorujące na cukrzycę powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania oraz poinformować o cukrzycy przy rejestracji. W dniu badania nie należy przyjmować porannej dawki insuliny ani doustnych leków hipoglikemizujących.
3. Osoby przyjmujące leki obniżające krzepliwość krwi powinny zastosować jeden z poniższych schematów:
 - ACENOKUMAROL, SINTROM, SINCUMAR – na 7 dni przed badaniem powinny zamienić przyjmowanie tego leku na heparynę drobnocząsteczkową po konsultacji z lekarzem
 - ASPIRYNA, ACARD, ACESAN, POLOCARD, KLOPIDOGREL, TIKLOPIDYNA i in. – na 7 dni przed badaniem powinny odstawić ten lek po konsultacji z lekarzem
 - ELIQUIS, XARELTO, PRADAXA, LIXIANA – na 2-3 dni przed badaniem powinny odstawić ten lek po konsultacji z lekarzem
4. Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem sposób przygotowania do badania.
5. Prosimy o dostarczenie lekarzowi dotychczasowej dokumentacji medycznej przed badaniem.
6. Badanie endoskopowe w znieczuleniu ogólnym wymaga obecności osoby towarzyszącej, która po badaniu przejmie opiekę i odwiezie chorego do domu.

WYZNACZONA GODZINA BADANIA MOŻE ULEC ZMIANIE – PONIEWAŻ CZAS TRWANIA KOLONOSKOPII MOŻE BYĆ TRUDNY DO PRZEWIDZENIA.

PROMYK CENTRUM MEDYCZNE

ul. o. Augustyna Kordeckiego 56,

42-226 Częstochowa, NIP: 573 271 43 97, REGON: 240757473

tel. 604 24 51 24, 34/372 39 39 mail: info@cmpromyk.pl, www: cmpromyk.pl